



Punto 1. Riofrío. Roquedo de granito con vegetación escasa de *Cytisus scoparius* y *Lavandula stoechas*. N = 96.



Punto 2. Ávila. Pastizal de gramíneas, con algún ejemplar de *Stipa gigantea*. N = 84.



Punto 3. Berrocalejo de Aragona. Pastizal de gramíneas, siendo muy frecuente *Stipa gigantea*, y algún ejemplar de *Rosa canina*. N = 80.




Punto 4. Martiherrero. Matorral de *Cytisus scoparius*, con *Lavandula stoechas* y herbáceas. N = 65.



Punto 5. Berrocalejo de Aragona. Matorral de *Quercus ilex ballota* y *Cytisus scoparius*, estando presentes también *Rosa canina*, *Stipa gigantea*, *Thymus mastichina* y *Centaurea calcitrapa*. N = 65.



Punto 6. Ávila. Monte adhesionado de encina (*Quercus ilex ballota*), con *Halimium umbellatum*, *Stipa gigantea*, *Ammophila arenaria* y *Bromus tectorum*. N = 60.



Punto 7. Ávila. Bosque denso de encina (*Quercus ilex ssp. ballota*), con matorral de encina, *Rosa canina*, *Halimium umbellatum*, *Stipa gigantea*, *Ammophila arenaria* y *Bromus tectorum*. N = 52.



Figura S1. Formaciones vegetales de la serie de vegetación Guadarrámico-Ibérica (supra-meso) silicícola de la encina (24a), con sus correspondientes números de curva.